

# Candiprin®

Inserto combinado ungüento



## Candiprin® Combinado

nistatina - óxido de zinc  
Ungüento



### FÓRMULA:

Cada gramo contiene:

Nistatina .....	100,000UI
Oxido de Zinc .....	200 mg
Excipientes.....	c.s.

**DESCRIPCIÓN:** La nistatina es un antifúngico tópico, es eficaz sólo contra las especies de *Cándida* y es más útil en el tratamiento de la candidiasis de la orofaringe, cutánea, mucocutánea, y vulvovaginal. La nistatina se une a los esteroides en las membranas celulares tanto de hongos como de células humanas. La nistatina es generalmente fungistática in vivo, pero puede tener actividad fungicida a concentraciones altas o contra organismos extremadamente susceptibles.

El óxido de zinc posee una acción desecante, astringente, reductora suave y queratoplástica.

**INDICACIONES:** **Candiprin® Combinado** está indicado en el tratamiento de infecciones micóticas causadas por *Candida (Monilia) albicans*, y en el tratamiento de la dermatitis del área del pañal. El óxido de zinc está indicado en escocedura (herida con sensación de prurito), irritación y erosión superficial de piel provocada por: quemadura leve, fístula, drenaje, úlcera por decúbito, incontinencia anal y urinaria, dermatitis de pañal.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Aplicar 2 veces por día en el área afectada.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a nistatina.

**INTERACCIONES:** No se han observado interacciones clínicamente significativas.

### PRECAUCIONES:

- No utilizar en infecciones micóticas sistémicas u oftálmicas, ni con vendajes oclusivos.
- Precaución. No se desaconseja, si bien deberá observarse la posible aparición de eventuales manifestaciones de intolerancia en el recién nacido (diarrea, rechazo de la leche materna).

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Los efectos secundarios de potencial significancia clínica, incluyen: Eritema, prurito, sensación de quemazón.

**SOBREDOSIS:** En caso de una sobredosis o intoxicación con este producto, se debe contactar inmediatamente al médico o al Centro de Toxicología más cercano, de no existir un Centro de Toxicología llevar al paciente al hospital más cercano.


**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar a temperatura ambiente (menor de 30°C).

### PRESENTACIÓN:

**Candiprin® Combinado:** Tubo de 30g.

**LABORATORIOS LAPRIN, S. A.**  
Guatemala, C. A.

# Guía de troquel y medidas



INDICACIONES		FIRMAS	
<p>Inserto de Candiprin Combinado ungüento Medida: 140x95 mm Papel: Bond 60 gramos</p> <p> negro</p> <p><b>Observaciones:</b> *DISEÑO PARA AJUSTAR A TROQUEL *Troquel indicado para efectos de referencia, en cuanto a distancias, tamaños de textos y elementos gráficos. *Medidas en milímetros *Textos aprobados por Ministerio de Salud de Guatemala. *Barra de control: 20mm de izquierda a derecha. Ubicada en el primer doblez (justo a la mitad, es decir 2 mm hacia arriba y 2 mm hacia abajo), este primer doblez está a 22 mm del borde superior *Última actualización del arte: 22 de junio de 2018</p>	ASUNTOS REGULATORIOS	Astrid Asencio	
	ASUNTOS REGULATORIOS	Ofyluz de García	