

Corifen®

Inserto gotas



Corifen®

acetaminofén
maleato de clorfeniramina
Gotas



FÓRMULA

Cada mL contiene:

Acetaminofén	100 mg
Maleato de Clorfeniramina	1 mg
Vehículo	c.s.

DESCRIPCIÓN

Corifen® tiene la asociación de dos principios activos: Acetaminofén y Maleato de Clorfeniramina. Acetaminofén es un analgésico y antipirético que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura. Maleato de Clorfeniramina es un antihistamínico, utilizado en el tratamiento de la alergia, actúa compitiendo con la histamina por los receptores H1 presentes en las células efectoras, con lo cual evita pero no revierten las respuestas mediadas únicamente por las histaminas. Como sedante hipnótico, el Maleato de Clorfeniramina atraviesa la barrera hematoencefálica y produce sedación por inhibición.

INDICACIONES

Corifen® es utilizado principalmente para aliviar los síntomas de gripe, como congestión nasal y dolor de garganta.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Niños menores de 2 años: Según indicación médica.

Niños de 2 – 5 años: 1 – 1.5 mL cada 6 horas.

CONTRAINDICACIONES

Excepto circunstancias especiales, este medicamento no debe usarse cuando existen los siguientes antecedentes: Hipersensibilidad al Acetaminofén o al Maleato de Clorfeniramina u otros antihistamínicos con estructura química similar. Insuficiencia hepatocelular grave, hepatitis vírica, en pacientes que estén en tratamiento con IMAO, en niños menores de 3 años, pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, úlcera péptica estenosante, asma bronquial, hipertiroidismo, enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión.

INTERACCIONES

En base a su significancia clínica, los siguientes medicamentos pueden tener problemas relacionados cuando se administra concomitantemente con **Corifen®**: El uso de inhibidores de la monoamino

oxidasa (IMAO), alcohol, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso central (SNC), los antihistamínicos pueden inhibir la acción de los anticoagulantes. Diuréticos del ASA, lamotrigina, zidovudina, probenecid, isoniazida, propranolol, anticolinérgicos, colestiramina, metoclopramida, domperidona, rifampicina y cloranfenicol.

PRECAUCIONES

-No administrar más de cinco (5) veces al día la dosis recomendada, ni por más de cinco (5) días consecutivos a niños. Si persiste el dolor o la fiebre por más de tres (3) días consecutivos, consultar al médico.

-La administración prolongada de dosis elevadas puede aumentar el riesgo de aparición de efectos renales.

-Puede ocurrir somnolencia, por lo que se debe considerar mientras se encuentre en tratamiento.

-Se debe seguir la dosis recomendada por el médico, ya que la sobredosificación del medicamento puede ocasionar fallo hepático, en caso se presente el cuadro clínico se recomienda utilizar como antídoto N-acetilcisteína.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios de potencial significancia clínica, incluyen:

Raras: Malestar, nivel aumentado de transaminasas, hipotensión, hepatotoxicidad, erupción cutánea, alteraciones hematológicas e hipoglucemia. Somnolencia ligera a moderada, urticaria, erupción, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad en la boca, nariz y garganta.

SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis o intoxicación con este producto, se debe contactar inmediatamente al médico o al Centro de Toxicología más cercano, de no existir un Centro de Toxicología llevar al paciente al hospital más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (menor de 30°C).

PRESENTACIONES

Frasco de 30 mL

EUROFARMA GUATEMALA, S. A.
Guatemala, C. A.