

# Dorcol® Forte

Inserto para comprimidos y solución inyectable



## Dorcol® Forte

Clonixinato de lisina  
Propinoxato clorhidrato  
Analgésico - Antiinflamatorio - Antiespasmódico



### FÓRMULA:

#### Dorcol® Forte Comprimidos

Cada comprimido contiene:

Clonixinato de Lisina .....	125 mg
Propinoxato Clorhidrato .....	10 mg
Excipientes .....	c.s.

#### Dorcol® Forte Ampollas

##### Ampolla A:

Cada ampolla de 2 mL contiene:

Clonixinato de Lisina .....	100 mg
Vehículo .....	c.s.

##### Ampolla B:

Cada ampolla de 2 mL contiene:

Propinoxato Clorhidrato .....	15 mg
Vehículo .....	c.s.

**INDICACIONES:** Para el alivio del dolor, procesos inflamatorios y espasmos especialmente de origen somático o visceral, postraumático o posquirúrgico.

### DOSIS:

Niños mayores de 12 años y adultos:

**Dorcol® Forte Comprimidos:** 1 a 2 comprimidos cada 5 ó 6 horas.

**Dorcol® Forte Ampollas:** 1 a 4 dosis al día. Cada dosis está constituida por las ampollas A y B.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Succione por medio de la jeringa, la solución contenida en la ampolla A, luego la solución de la ampolla B. Agite y luego administre inmediata y lentamente por vía IM o IV.

**CONTRAINDICACIONES:** En pacientes que presenten hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula, úlcera péptica, hemorragia gastroduodenal, estenosis pilórica orgánica, hernia hiatal, hipertrofia de próstata, glaucoma, tirotoxicosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o estenosis mitral.

**PRECAUCIONES:** Durante el embarazo o lactancia y niños menores de 12 años.

**EFECTOS SECUNDARIOS:** En raras ocasiones puede presentarse sequedad de boca, constipación, náuseas, vómitos, irritación gástrica o somnolencia.

### PRESENTACIONES:

**Dorcol® Forte Comprimidos:** caja x 20 y 200 comprimidos.

**Dorcol® Forte Ampollas:** caja con 3 dosis.

**LABORATORIOS LAPRIN, S. A.**  
Guatemala, C. A.