

Gabilep®

Inserto



Gabilep®

gabapentina



FÓRMULA:

Gabilep® 300mg: Cada cápsula contiene:

Gabapentina 300 mg

Excipientes C.S.

Gabilep® 400mg: Cada cápsula contiene:

Gabapentina 400 mg

Excipientes C.S.

DESCRIPCIÓN: Gabilep®, es un medicamento antineurálgico y anticonvulsivante. Se distribuye ampliamente por todo el organismo, no se metaboliza apreciablemente y se elimina por excreción renal principalmente.

INDICACIONES: En el tratamiento de neuralgia producida por las infecciones del virus del Herpes. Mono y polineuritis diabética. Compresiones radiculares a cualquier nivel de la columna vertebral. Como monoterapia o terapia adjunta en crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria en adultos y adolescentes.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Dosis usual para adultos y adolescentes

Neuralgia producida por la Infección del virus del Herpes: El primer día una dosis individual de 300 mg. Incrementándose la dosis gradualmente dos veces al día hasta un máximo de 1800 mg. No se obtiene mejor alivio para esta indicación aumentando la dosis.

Dolor neuropático: Inicialmente 300 mg 3 veces al día, hasta un máximo de 3600 mg por día. Según tolerancias y eficacia.

Anticonvulsivante: Inicialmente 300 mg tres veces al día. La dosis se

incrementa gradualmente basada en la respuesta clínica, pueden alcanzarse hasta 2400 a 3600 mg al día según tolerancia y los resultados en el curso de la enfermedad.

Nota: Pacientes con insuficiencia renal demostrada requieren ajuste de la dosis, espaciando el tiempo de administración o disminuyendo la dosis según tolerancia y eficacia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: La suspensión del tratamiento con gabapentina así como la adición de otro medicamento para tratar la epilepsia debe hacerse de forma gradual. No se aconseja la conducción de vehículos ni el manejo de maquinaria pesada o de precisión durante las primeras semanas de tratamiento con este medicamento.

La ingestión de bebidas alcohólicas puede aumentar el riesgo de depresión del Sistema Nervioso Central. Uso prudente en pacientes psicóticos. No utilizarlo durante el embarazo ni la lactancia a menos que esté plenamente justificado debido a que atraviesa la barrera placentaria y mamaria.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a gabapentina u otro ingrediente de la fórmula. Pacientes con deterioro de la función renal. No utilizar en niños menores de 3 años.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: La absorción de Gabilep® se reduce por la acción de los antiácidos. El uso concomitante con morfina o la ingesta de bebidas alcohólicas puede incrementar la depresión del Sistema Nervioso Central. El uso simultáneo con Naproxeno puede incrementar la cantidad absorbida de gabapentina.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Los efectos secundarios que ocurren con mayor frecuencia son ataxia y astenia. También puede producir somnolencia y mareos, nistagmus, problemas neuropsiquiátricos, hostilidad, hiperquinesia y otros desórdenes (problemas de concentración, etc.).

PRESENTACIÓN

Gabilep® 300mg: Caja x 30 cápsulas

Gabilep® 400mg: Caja x 30 cápsulas

EUROFARMA GUATEMALA,
S. A. Guatemala, C. A.