

Metiom® H. Pylori

Inserto



Metiom® H. pylori

esomeprazol - levofloxacina -
amoxicilina



FÓRMULA:

Cada cápsula de **Esomeprazol 40mg Cápsulas con Gránulos de Liberación Retardada** contiene:
Esomeprazol magnésico trihidratado pellets equivalente a Esomeprazol 40 mg
Excipientes..... c.s.

Cada comprimido de **Levofloxacina 500mg Comprimidos Recubiertos** contiene:
Levofloxacina (Hemihidrato) equivalente a base 500 mg
Excipientes..... c.s.

Cada cápsula de **Amoxicilina 500mg Cápsulas** contiene:
Amoxicilina (Trihidratada) equivalente a base 500 mg
Excipientes..... c.s.

DESCRIPCIÓN: El esomeprazol es un inhibidor de la secreción de ácido gástrico con mayor potencia que los existentes. La levofloxacina es un antibacteriano activo contra gérmenes gram-positivos y gram-negativos. La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, de excelente absorción por vía oral, de rápida respuesta clínica y buena tolerancia.

INDICACIONES: Tratamiento de infección gástrica por *Helicobacter pylori*. El tratamiento conjunto de Esomeprazol-Levofloxacina-Amoxicilina se utiliza como tratamiento de rescate cuando han fracasado los esquemas convencionales.

PRECAUCIONES: En el caso de amoxicilina pueden producirse reacciones de hipersensibilidad igualmente que con el resto de penicilinas, se debe determinar si el paciente tuvo reacciones alérgicas previas a cefalosporinas, cefamicinas y otros beta lactámicos por la posibilidad de reacciones cruzadas. En la lactancia los infantes podrían sensibilizarse si la madre recibe este medicamento. Pacientes con infecciones virales concomitantes, con leucemia o sarcoma y con insuficiencia renal, y en casos de colitis ulcerosa o pseudomembranosa asociada a antibióticos.

El esomeprazol debe ser utilizado con precaución en pacientes con deterioro de la función hepática. Antes de iniciar un tratamiento con esomeprazol debe descartarse la posibilidad de carcinoma gástrico, debido a que este fármaco puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico.

La levofloxacina en pacientes con epilepsia o con antecedentes de trastornos del SNC queda bajo supervisión del médico tratante por el riesgo de convulsiones. Se debe asegurar la correcta hidratación del paciente con objeto de prevenir la formación de cristales en la orina. Se recomienda que los pacientes eviten una excesiva exposición a la luz solar y si se produce fototoxicidad, el tratamiento debe ser interrumpido. En caso de aparición de rash cutáneo u otros signos de alergia, debe suspenderse la administración.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Las dosis habituales son:

Esomeprazol 40 mg Cápsulas con Gránulos de Liberación Retardada: administrar 1 cápsula 30-40 minutos antes del desayuno y 1 cápsula 30-40 minutos antes de la cena.

Levofloxacina 500 mg Comprimidos Recubiertos: administrar 1 comprimido durante el desayuno.

Amoxicilina 500 mg Cápsulas: administrar 2 cápsulas después del desayuno y 2 cápsulas después de la cena.

Duración del tratamiento: 10 días

DESAYUNO	CENA
Esomeprazol 40mg Tomar 1 cápsula 30-40 minutos antes del desayuno 	Esomeprazol 40mg Tomar 1 cápsula 30-40 minutos antes de la cena 
Levofloxacina 500mg Tomar 1 comprimido durante el desayuno 	Amoxicilina 500mg Cápsulas Tomar 2 cápsulas después de la cena 
Amoxicilina 500mg Cápsulas Tomar 2 cápsulas después del desayuno 	

EFFECTOS SECUNDARIOS: En general los tres medicamentos son bien tolerados y las reacciones podrían ser cefalea, diarrea, náusea, vómitos, flatulencia, estreñimiento, dolor abdominal y dispepsia.

PRECAUCIONES: La administración en mujeres embarazadas, en período de lactancia y en pacientes menores de 18 años es según criterio del médico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos y demás componentes de las formulaciones.

PRESENTACIÓN: Metiom®H. pylori: Caja con 20 cápsulas de Esomeprazol 40mg + 10 Comprimidos de Levofloxacina 500mg + 40 cápsulas de Amoxicilina 500mg.

LABORATORIOS LAPRIN, S. A.
Guatemala, C. A.