Eurofarma

Código atual: **22xxx** Substitui: 227903-01

Substituir a arte anterior por esta, caso esteja em seu poder

Produto: BULA- GINNA 40 g- guatemala, bolivia, Paraguai, ecuador y Uruguay

Dimensional: 210 x 150mm

Data: 19/12/16

Cores: PRETO

CONTROLE DE CHANGE CONTROL

Código Anterior	Código Atual	Alteração	Finalizado
227903-00	227903-01	CM 12884 Alteração Farmacêutica Responsável nas Artes de Material de Embalagem (subsidiária Bolívia e Exportação)	
227903-01	22xxx	inclusão dos dizeres legais de Uruguay e ecuador	

210 mm

150 mm

APROVAÇÃO DE DOBRAS - ENGENHARIA

Bula **DOBRADA** | Bula **ABERTA**

Eurofarma **ARTE FINAL** (Adobe InDesign)

1416714

Eurofarma

Ginna

Nitrato de fenticonazol

USO VAGINAL
Crema Vaginal
USO ADULTO

FORMA FARMACÉUTICA Y PRESENTACIONES

Tubo con 40 g + 7 aplicadores descartables con capacidad de 5 g cada uno.

Composición
Cada 100 g de crema contienen:
Nitrato de Fenticonazol 2g
Excipientes c.s.p.....100g
Excipientes: propilenglicol, edetato disódico, metilparabeno, propilparabeno, alcohol cetoestearílico, polisorbato 60, miristato de isopropilo, vaselina líquida, alcohol lanolina, alcohol oleico y agua desionizada.

INFORMACIONES AL PACIENTE

Ginna (Nitrato de Fenticonazol) debe ser utilizado solamente bajo supervisión médica.

¿Qué es y para qué sirve Ginna (Nitrato de Fenticonazol)?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) es un antimicótico indicado para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por hongos.

¿Cómo debe almacenarse Ginna (Nitrato de Fenticonazol)?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) debe ser mantenido en su estuche original. **En Ecuador** conservado a temperatura ambiente no mayor a 30°C.
En Uruguay, Paraguay, Bolivia conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).
En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, almacenar a temperatura ambiente (menor 30ºC)

¿Cuál es el período de validez de Ginna (Nitrato de Fenticonazol)?
El período de validez de Ginna (Nitrato de Fenticonazol) es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación impresa en el estuche del producto.
Al utilizar el medicamento, consulte siempre su período de validez.
NO USE EL MEDICAMENTO CON PERIODO DE VALIDEZ VENCIDO.
Además de no conseguir el efecto deseado, las sustancias se pueden alterar y causar daño a su salud.

¿Ginna (Nitrato de Fenticonazol) puede ser usado durante el embarazo y lactancia?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) no está recomendado durante el embarazo, especialmente en los primeros 3 meses. Informe a su médico la ocurrencia de embarazo en el período del tratamiento o después de su término. Informe a su médico si está en período de lactancia. Mujeres embarazadas no deben usar aplicador sin orientación médica.

¿Cómo debe ser utilizado Ginna (Nitrato de Fenticonazol)?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) debe usarse solamente con el aplicador que acompaña el producto, para administración vaginal.
Observe las instrucciones para aplicación en el ítem POSOLOGÍA (Instrucciones para su uso).
Lave bien sus manos antes y después de las aplicaciones con Ginna (Nitrato de Fenticonazol).
Todas las aplicaciones deben hacerse por la noche antes de acostarse.
Siga la orientación de su médico, respetando siempre los horarios, las dosis y la duración del tratamiento.
Para evitar una reinfección, la pareja debe tratarse conforme orientación médica específica.
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) no es grasoso, no mancha y puede ser removido fácilmente con agua.

¿El tratamiento Ginna (Nitrato de Fenticonazol) puede ser interrumpido?
No interrumpir el tratamiento sin el consentimiento de su médico. Sólo el médico podrá evaluar la evolución de su tratamiento y decidir cuándo y cómo este deberá ser interrumpido.

¿Cuáles son las posibles reacciones adversas con el uso de Ginna (Nitrato de Fenticonazol)?
Después de la aplicación de Ginna (Nitrato de Fenticonazol) puede ocurrir un leve ardor, que deberá desaparecer rápidamente.
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) generalmente no irrita la piel y las mucosas.
Informe a su médico la aparición de reacciones desagradables, como por ejemplo, ardor y picazón.

TODO MEDICAMENTO DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

¿Ginna (Nitrato de Fenticonazol) puede ser utilizado con otros medicamentos?
Hasta el momento no se observó la existencia de interacciones medicamentosas con Ginna (Nitrato de Fenticonazol).

¿Cuándo Ginna (Nitrato de Fenticonazol) no debe ser utilizado?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) no debe ser utilizado en caso de alergia conocida al nitrato de fenticonazol o a los componentes del producto o hipersensibilidad a otros componentes imidazolicos. Se recomienda no utilizar el producto durante el período menstrual.

¿Cuándo el uso de Ginna (Nitrato de Fenticonazol) requiere cuidados especiales?
Ginna (Nitrato de Fenticonazol) debe ser usado solamente con el aplicador que acompaña el producto, para administración vaginal.
Mujeres embarazadas no deben usar aplicador sin orientación médica.
Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté usando, antes del inicio o durante el tratamiento.

En caso de ingestión accidental del producto, ¿qué medidas debe tomar?
En caso de ingestión accidental, contacte inmediatamente a su médico, o acuda a una sala de emergencias, informando la cantidad ingerida, hora de ingestión y los síntomas.

NO INGIERA MEDICAMENTOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU MÉDICO, PUEDE SER PELIGROSO PARA LA SALUD.

INFORMACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Farmacodinámica
El nitrato de fenticonazol es un antimicótico de amplio espectro. *In vitro*: Alta actividad fungostática y fungicida en dermatofitos (todas las especies de *Trichophyton, Microsporum* y *Epidermophyton*), en *Candida albicans* y otros agentes micóticos causantes de infecciones de la piel y mucosa.
In vivo: Cura en 7 días de micosis cutáneas causadas por *Cándida* y dermatofitos en cobayas. El nitrato de fenticonazol también tiene actividad antibacteriana en Gram-positivos.
Mecanismo de Acción: Inhibición de la oxidasa del citocromo P450 de la célula fúngica, inhibiendo la formación de ergosterol y alterando la permeabilidad de la membrana. El fenticonazol causa desintegración de la estructura de las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas y del retículo endoplasmático, induciendo así la destrucción del hongo.
El nitrato de fenticonazol también se ha mostrado activo, tanto *in vivo* como *in vitro* en *Tricomonas vaginalis*.

Farmacocinética
El grado de absorción del nitrato de fenticonazol tritiado (o triciado) en humanos, medido después de aplicación dérmica o vaginal fue muy bajo. La exposición máxima observada después de la aplicación dérmica fue 1,3 g de nitrato de fenticonazol, en la forma de crema vaginal 2% (correspondiente a 26 mg/kg de principio activo), sobre un área de 400 cm^2, o 25 µmol de spray 2% (correspondiente a 5,4mg/kg de principio activo), sobre un área de 50 cm^2 fue, respectivamente de 1,2 µg/kg y 1,6 µg/kg. Después de la administración vaginal de óvulos de 200 mg ó 1000 mg a voluntarias saludables y pacientes con candidiasis vulvovaginal, se observó una media de 1,34% ± 0,82 (desviación estándar) y 1,81% ± 0,57 (desviación estándar), la exposición máxima correspondiente fue de 91 µg/kg y 400 µg/kg.
Teniendo en cuenta la magnitud de la absorción oral en ratas y perros, es de 20 mg/kg/día fue el nivel de la dosis sin efecto en la toxicidad crónica y en los estudios reproductivos, se puede observar que los animales toleran bien la administración repetida de cantidades de nitrato de fenticonazol 5.000 a 10.000 veces y 21 a 134 veces mayores que aquellas sistemáticamente absorbidas en humanos después de la administración dérmica o vaginal, respectivamente.

1416714

1416714

La baja absorción sistémica de nitrato de fenticonazol después de la aplicación cutánea o vaginal y confirmada por la monitorización de los niveles plasmáticos de la droga durante y al final de la terapia, en pacientes tratados con espuma dérmica 2%, loción 2% o ducha vaginal 0,2%. En todas las muestras analizadas, la concentración plasmática de nitrato de fenticonazol fue de 5 ng/mL.

INDICACIONES
Ginna (nitrato de fenticonazol) está indicado para el tratamiento de candidiasis de la mucosa vaginal (vulvovaginitis, vaginitis y leucorrea).

CONTRAINDICACIONES
HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al momento de la aplicación en la lesión o de la inserción intravaginal, puede ocurrir una leve sensación de ardor que desaparece rápidamente.
El uso de productos para la aplicación tópica, especialmente por tiempo prolongado, puede causar sensibilización. En ese caso, se debe suspender el tratamiento para establecer una terapia conveniente.
Mujeres embarazadas no deben utilizar aplicador sin orientación médica.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Aunque la absorción vaginal de Ginna (fenticonazol nitrato) es muy baja, no se recomienda el uso del producto durante el embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se conocen interacciones con otros medicamentos ni otras formas de interacción.

REACCIONES ADVERSAS
Ginna (nitrato de fenticonazol) es generalmente bien tolerado tanto en la piel como en la mucosa. Reacciones eritematosas leves y pasajeras o sensación de ardor fueron informadas y normalmente desaparecen con rapidez.
En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de resistencia a los microorganismos, el tratamiento debe ser suspendido.
Cuando se usa conforme las instrucciones, **Ginna** (nitrato de fenticonazol) es muy poco absorbido y por lo tanto pueden excluirse repercusiones de naturaleza sistémica.

POSOLOGÍA
Crema vaginal 0,02 g/g: La crema debe ser introducida en la vagina con el aplicador lleno (5 g de crema). Se debe utilizar un aplicador por día, que debe ser descartado después de su uso. La crema debe ser utilizada por 7 días consecutivos. Para evitar una reinfección, la pareja también debe tratarse conforme orientación médica específica.
- Siga las instrucciones ilustradas en los siguientes diagramas.
- Asegúrese que el aplicador esté perfectamente limpio.

Instrucciones para el uso
Lavar bien las manos antes y después de las aplicaciones con Ginna (nitrato de fenticonazol). Todas las aplicaciones deben ser hechas en la noche, antes de dormir.

Aplicador de crema (Tubo)



1. Perfore completamente la tapa del tubo con la parte de atrás de la tapa y enrosque el aplicador en el tubo en el lugar de la tapa.



Apriete el tubo suavemente en su parte inferior (fondo), para llenar el aplicador. En caso que haya cierta resistencia del émbolo, tire de él delicadamente.
El aplicador debe ser llenado completamente.

2. Remueva el aplicador del tubo y cierre inmediatamente el tubo con la tapa.



Acostada, con las piernas ligeramente flexionadas y separadas, introduzca delicadamente el aplicador profundamente en la vagina y empuje el émbolo completamente. Después hale el aplicador hacia afuera sin tocar el émbolo.

3. Descartar el aplicador.

SOBREDOSIS
Hasta el momento no se observaron casos de sobredosis con el producto, pues **Ginna** (nitrato de fenticonazol) es muy poco absorbido, cuando se usa conforme instrucciones y por lo tanto pueden excluirse repercusiones de naturaleza sistémica.

PACIENTES ANCIANAS.
No hay hasta el momento, estudios adecuados relacionados con la edad al uso del producto.
Lote, fecha de fabricación y período de validez: Ver estuche.

Fabricado en Brasil por:
EUROFARMA LABORATORIOS S.A., Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 - Itapevi – SP - Industria Brasilera
Farm. Resp.: Dra. Maria Benedita Pereira - CRF-SP 30.378

En Bolivia
Registrado por: LABORATORIOS EUROFARMA BOLIVIA S.A.
Av. Doble Vía La Guardia N° 5265
Registro Sanitario: II-54564/2014
Santa Cruz - Bolivia
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA

En Guatemala, El Salvador y Nicaragua
Registrado por: LABORATORIOS LAPRIN, S. A. DE GUATEMALA.
Registros Sanitarios: Guatemala PF- 50615
El Salvador F036721072016
Nicaragua 01139980116
Resp. Lic. O. C. de García.
SERVICIO AL CLIENTE LABORATORIOS LAPRIN:
(502) 6637-4569
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA

En Paraguay
Importado por: EUROFARMA PARAGUAY S.A
OFICINA: Edificio Citi Center, 4to piso. Nº418
Mcal. López 3794, / CP: 1892. Telf.: 021 6207752-75
Asunción, Paraguay
DEPÓSITO: La Policlínica Rojas Silva 1044 c/ Tte Fariña.
Telf: 021 - 212500 -
Autorizado por la D.N.V.S Nº: 20749-01-EF
DT: QF. Angela Romero RP.Nº: 4.756
En caso de sobredosis acudir a:
Centro Nacional de Toxicología en Centro de Emergencias Medicas
Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Móngelos
Telf: 021-204.800 - Asunción Paraguay
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA

En Uruguay
Representante: EUROFARMA URUGUAY S.A
Democracia 2132 - Tel.: 2401 5454 - Fax: 2402 0202
Montevideo-Uruguay - Ley 15.443-Reg. Lab. N° 19
Aut. M.S.P. Nº 43867
Director Técnico: Q.F. Alexis Arana
Control médico recomendado
Mantener fuera del alcance de los niños

En Ecuador
Importado y distribuido por: Eurofarma S.A. Quito-Ecuador
Nº Registro Sanitario:1558-MEE-1215
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

22xxx (A) - (12/16)

1416714

BRASIL
ARTES
CHECK LIST
- Fuente padron
- Código visual
- Braille
- Largura de las tarjas e tamaño de las fuentes
- Pharmacode / C128 (codigo del producción
- Código de barras GTIN 13 (EAN)
- Las Tarjas

BRASIL
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM
CHECK LIST
- Pharmacode / C128
- Dimensionais
- Desenho Técnico
- Número de faca
- Sentido de bobinamento
- Bula Dobrada ou Aberta
- Lâmina mista
- Reserva de verniz
- Fotocélula
- Código Acabado
- Código de material
- Número do GEO
- Conteúdo
- Lote - Fab. - Val.
- Tinta Reativa
- Apresentações comercializadas/lançadas

BRASIL
ENGENHARIA
CHECK LIST
- Pharmacode / C128
- Dimensionais
- Desenho Técnico
- Sentido de bobinamento
- Bula Dobrada ou Aberta
- Lâmina mista
- Reserva de verniz (local e espaço suficientes)
- Fotocélula
- Viabilidade do layout tecnicamente
- Lote - Fab. - Val.

DIRECCION TECNICA BOLIVIA
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
- Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada

PARAGUAI
ASUNTOS REGULATORIOS
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
- Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada
- Layout padron Eurofarma o de otra empresa
- Muestra médica

ECUADOR
APROBACIÓN DE ECUADOR
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
-Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada
- Logotipo de las empresas
- Layout padron Eurofarma o de otra empresa
-Muestra médica

URUGUAI
DIRECCION TECNICA
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
- Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada

URUGUAI
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CHECK LIST
- El Código de barras GTIN 13 (EAN)
- Código Acabado
- Código de los materiales del empaques
- Número de lo Cambio del alteraciones
- Contenido
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Composición
- Plazo de validade
- Cuidados de conservación
- Farmacéutico responsable
- CRF/CRMV
Número del registro o licencia

URUGUAI
GERENCIA COMERCIAL
CHECK LIST
- Contenido
- Colores
- Nombre de la marca comercial
- DCI
- Concentracieon
- Indicaciones del uso
- Telefono ao consumidor
- Logotipo dde las empresas
- Ilustraciones
- Frase obligatorias para la licitaciones
- Nouva formulación
- Muestra médica
- Layout padron Eurofarma o de otra empresa
-frase nueva embalaje
- Apresentaciones comercializadas
- ® Marca registrada

GUATEMALA
GERENTE DE ENTRENAMIENTO
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
- Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada

GUATEMALA
GERENTE DE PRODUCTO
CHECK LIST
- Contenido
- Colores
- Nombre de la marca comercial
- DCI
- Concentracieon
- Indicaciones del uso
- Telefono ao consumidor
- Logotipo dde las empresas
- Ilustraciones
- Frase obligatorias para la licitaciones
- Nouva formulación
- Muestra médica
- Layout padron Eurofarma o de otra empresa
-frase nueva embalaje
- Apresentaciones comercializadas
- ® Marca registrada

GUATEMALA
GERENCIA DE MARKETING
CHECK LIST
- Contenido
- Colores
- Nombre de la marca comercial
- DCI
- Concentracieon
- Indicaciones del uso
- Telefono ao consumidor
- Logotipo dde las empresas
- Ilustraciones
- Frase obligatorias para la licitaciones
- Nouva formulación
- Muestra médica
- Layout padron Eurofarma o de otra empresa
-frase nueva embalaje
- Apresentaciones comercializadas
- ® Marca registrada

GUATEMALA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS REGULATORIOS
CHECK LIST
- Contenido
- La Tinta Reativa
- Arte de acuerdo con la legislação vigente de los empaques
- Texto obligatório de los materiales de embalaje
- La conferencia de lo texto técnico y ortografía
- La conferencia de todas las caras da embalaje secundária y repeticiones de la embalaje primária
- Colores
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Restricción de uso
- Composición
- Plazo de vencimiento
- Cuidados de la conservación
- Datos de lo detentor del registro
- Datos de local de fabricación
- Datos de lo responsable por la comercialización
- Farmacéutico responsable e CRF/CRMV
-Telefone de Atendimiento ao consumidor
- Frases de advertencias
- Frases obligatorias
- Logotipo de las empresas
- Ilustración
- Tarjas o recuardo
- Texto en las tarjas
- Frase obligatórias en las Licitaciones
- Nueva fórmula
- Dizeres de muestra médica
- Lote - Fab. - Val.
Número del registro o licencia
- ® Marca registrada

GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL
CHECK LIST
- El Código de barras GTIN 13 (EAN)
- Código Acabado
- Código de los materiales del empaques
- Número de lo Cambio del alteraciones
- Contenido
- Nombre del a Marca comercial
- DCI
- Concentraciones
- Vía de Administración
- Forma farmacéutica
- Composición
- Plazo de validade
- Cuidados de conservación
- Farmacéutico responsable
- CRF/CRMV
Número del registro o licencia